




**PROTEGE A TU GATO
VACUNALO A SUS
FECHAS INDICADAS.**



info@latinxvma.org



**RINOTRAQUEITIS
FELINA**

Referencia:
Tilley, L & Smith F. (2015). *Blackwell's Five-Minute
Veterinary Consult: Canine and Feline*
(Sixth Edition). John Wiley & Sons, Inc.

Latinx Veterinary Medical
Association

RINOTRAQUEITIS FELINA

La rinotraqueitis es una enfermedad respiratoria causada por el virus del herpes "Rinotraqueitis" significa inflamación de la nariz y la tráquea. El virus del herpes 1 también afecta el tracto reproductivo y puede causar problemas durante el embarazo. El virus del herpes felino tipo 1 es responsable del 80% al 90% de las enfermedades infecciosas del tracto respiratorio superior felino.

TRANSMISIÓN

La rinotraqueitis felina se transmite entre los gatos a través del contacto directo con los ojos o la nariz de un gato infectado o mediante objetos contaminados, como los tazones de comida y agua.

SINTOMAS / CAMBIOS OBSERVADOS EN LA MASCOTA

- Inicio repentino de estornudos paroxísticos (es decir, los episodios de estornudos ocurren repentinamente a intervalos bastante regulares).
- Entrecerrar los ojos o parpadeo espasmódico y secreción de los ojos.
- Falta de apetito
- Aborto
- Fiebre: hasta 106 ° F (41 ° C)
- Inflamación de la nariz (rinitis): secreción de la nariz; puede ser transparente o puede contener moco y / o pus.
- Inflamación de los ojos (conjuntivitis): secreción de los ojos; puede ser transparente o puede contener moco y / o pus.
- Inflamación de la córnea, la capa externa transparente de la parte frontal del ojo (conocida como "queratitis"): ulceración de la córnea o ulceración extremadamente profunda de la córnea, a la membrana más interna de la córnea (conocida como "descemetocel"), que puede conducir a la ruptura del ojo.

DIAGNÓSTICO

- Prueba de PCR de la torunda faríngea y conjuntival para determinar la presencia del virus.
- Ensayo Inmunofluorescente del raspado conjuntival o nasal.
- Frotis conjuntival teñido para detectar cuerpos de inclusión intranucleares.

FACTORES DE RIESGO

- Falta de vacunación contra el virus del herpes felino tipo 1; aunque la vacunación puede no prevenir la infección por completo,
- Instalaciones con múltiples gatos con hacinamiento, con pobre ventilación, pobre higiene, mala nutrición o estrés físico o psicológico.
- Embarazo y lactancia (lactancia).
- Enfermedad coexistente, especialmente debido a agentes causantes de enfermedades que disminuyen la capacidad de desarrollar una respuesta inmune normal (conocida como "inmunosupresora") o causar otras enfermedades respiratorias.
- Gatitos nacidos de madres gatas (conocidas como "reinas") que no tienen signos de rinotraqueitis, pero albergan el virus del herpes felino y pueden transmitirlo (conocido como "reinas portadoras") infectadas alrededor de las 5 semanas de edad.

TRATAMIENTO

- Antibióticos de amplio espectro: ampicilina o amoxicilina o combinaciones de antibióticos para infecciones bacterianas secundarias.
- Antibióticos aplicados directamente al ojo (tratamiento tópico): para la inflamación de la córnea (queratitis)
- Medicamentos para eliminar el virus aplicado directamente al ojo (conocidos como "antivirales oftálmicos"): trifluridina, cidofovir, idoxuridina (puede ser irritante para algunos gatos), ganciclovir, aciclovir; para úlceras causadas por el virus del herpes; debe administrarse cada 2 horas para obtener un efecto significativo.